$$z_1 \cdot z_2 = r_1 \cdot r_2 \left(\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \cdot \sin(\varphi_1 + \varphi_2) \right)$$

ТЕОРЕМА: ... $z_1, z_2, \ldots, z_n$ дати к.б. $z_i = r_i(\cos\varphi_i + i\sin\varphi_i)$, $i = 1, 2, \ldots, n$ • ... $z_1 \cdot z_2 \cdots z_n$ једнаки

$$z_1 \cdot z_2 \cdots z_n = r_1 \cdot r_2 \cdots r_n \left(\cos(\varphi_1 + \varphi_2 + \ldots + \varphi_n) + i \cdot \sin(\varphi_1 + \varphi_2 + \ldots + \varphi_n) \right)$$

ТЕОРЕМА: .. $z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$, $n \in \mathbb{N}$ дати природан број.

$$z^n = r^n \left(\cos(n\alpha) + i \cdot \sin(n\alpha) \right)$$

ДЕЉЕЊЕ БРОЈА У ТРИГОНОМЕТРИЈСКОМ ОБЛИКУ


$z_1 = r_1(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1)$

$z_2 = r_2(\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2)$, $r_2 = |z_2|$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1}{z_2} \cdot \frac{\bar{z}_2}{\bar{z}_2} =$$

$\frac{z_1}{z_2}$ остаје, $\frac{\bar{z}_2}{\bar{z}_2} = |z_2|^2 = r_2^2$

Шта је са $\bar{z}_2$?



$$\bar{z}_2 = r_2 \cdot (\cos(-\varphi_2) + i\sin(-\varphi_2))$$

$$= \frac{r_1(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1)}{r_2^2} \cdot r_2 (\cos(-\varphi_2) + i\sin(-\varphi_2))$$

$$= \frac{r_1}{r_2} \left(\cos\varphi_1 \cdot \cos(-\varphi_2) + i\sin\varphi_1\cos(-\varphi_2) + i\cos\varphi_1\sin(-\varphi_2) + \underbrace{i^2}_{-1}\sin\varphi_1\sin(-\varphi_2) \right)$$

$\cos\varphi_1\cos(-\varphi_2) - \sin\varphi_1\sin(-\varphi_2) = \cos(\varphi_1 - \varphi_2)$

$i\sin\varphi_1\cos(-\varphi_2) + i\cos\varphi_1\sin(-\varphi_2) = i\sin(\varphi_1 - \varphi_2)$

$$= \frac{r_1}{r_2}\left(\cos(\varphi_1-\varphi_2)+i\sin(\varphi_1-\varphi_2)\right)$$

$$\boxed{\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2}\left(\cos(\varphi_1-\varphi_2)+i\sin(\varphi_1-\varphi_2)\right)}$$

Пример: $z_1 = \cos\left(-\frac{3\pi}{4}\right)+i\sin\left(-\frac{3\pi}{4}\right)$

$z_2 = 2\left(\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)+i\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right)$. Одредити $\frac{z_1}{z_2}$?

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{1}{2}\left(\cos\left(\underbrace{-\frac{3\pi}{4}-\left(-\frac{\pi}{4}\right)}_{-\frac{2\pi}{4},\ -\frac{\pi}{2}}\right)+i\sin\left(-\frac{3\pi}{4}-\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right)\right)$$

$$= \frac{1}{2}\left(\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right)+i\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)\right) \leftarrow \text{шарш. запис}$$

Алгебарски?

$\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right) \downarrow 0$ $\quad$ $\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) \downarrow -1$

$$= \frac{1}{2}(0-i) = -\frac{i}{2}$$

КОРЕН КОМПЛЕКСНОГ БРОЈА

ДЕФ: Број z је n-ти корен од a, .. $z^n = a$

$z^{(n)} = a$ ← познато

↓ непознато! ↘ ово је познато $a = |a|(\cos\alpha + i\sin\alpha)$

← Решавамо ову једначину!

Уопште следеће важи:

$$z_k = \sqrt[n]{|a|}\left(\cos\frac{\alpha+2k\pi}{n}+i\sin\frac{\alpha+2k\pi}{n}\right),\ k=0,1,..,n-1$$

Проверимо да ли важи $(z_k)^n = a$?

$$(z_k)^n = \left(\sqrt[n]{|a|}\right)^n \left(\cos\left(n\cdot\frac{\alpha+2k\pi}{n}\right) + i\sin\left(n\cdot\frac{\alpha+2k\pi}{n}\right)\right)$$

$z^n = r^n(\cos(n\alpha) + i\sin(n\alpha))$

$$= |a|\left(\cos(\alpha+2k\pi) + i\sin(\alpha+2k\pi)\right),\ k=0,1,\dots,n-1$$

да ли смо добили z ?

$a = |a|(\cos\alpha + i\sin\alpha)$

↓ увек треба да буде $\in[-\pi,\pi]$. Да би се свако k вратило у тај интервал.

$\Rightarrow$ Закључујемо да су сваки z_k заиста решења једн. $z^n = a$.

Пример Решити једн. $z^3 = 1$.

Наћи $z = \sqrt[3]{1}$.

Наћи све коренe из 1...

Користимо формулу:

$$z_k = \sqrt[n]{|a|}\left(\cos\frac{\alpha+2k\pi}{n} + i\cdot\sin\frac{\alpha+2k\pi}{n}\right),\ k=0,1,\dots,n-1$$


$z^3 = 1 = a$ а нам треба записано у триг. облику

$a = 1\cdot(1+0\cdot i)$

↓ ↓

α? $\cos\varphi$ $\sin\varphi$

$\varphi = 0$



$\Rightarrow$ $a = 1\cdot(\cos 0 + i\sin 0)$

$$z_k = \sqrt[3]{|a|}\left(\cos\frac{0+2k\pi}{3} + i\cdot\sin\frac{0+2k\pi}{3}\right),\ k=0,1,2$$

z_k: z_0, z_1, z_2 ; $\sqrt[3]{|a|}$: $|a| = 1$; $n = 3$; $k = 0,1,\dots,n-1$


$k=0$:

$$z_0 = \sqrt[3]{1}\left(\cos\frac{0+0\cdot\pi}{3} + i\cdot\sin\frac{0+0}{3}\right) =$$

$$= 1\ (\cos 0 + i\cdot\sin 0) \leftarrow \text{триг. запис}$$

$$= 1\cdot(1 + i\cdot 0)$$

$$= 1 \leftarrow \text{алгебарски запис}$$



$k=1$:

$$z_1 = \sqrt[3]{1}\left(\cos\frac{0+2\pi}{3} + i\sin\frac{2\pi}{3}\right)$$

$$= 1\cdot\left(\cos\frac{2\pi}{3} + i\cdot\sin\frac{2\pi}{3}\right) \leftarrow \text{тригонометр. запис}$$

$$= -\frac{1}{2} + i\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} \leftarrow \text{алгебарски запис}$$

$k=2$:

$$z_2 = \sqrt[3]{1}\left(\cos\frac{0+4\pi}{3} + i\sin\frac{4\pi}{3}\right)$$

$$= 1\left(\cos\frac{4\pi}{3} + i\cdot\sin\frac{4\pi}{3}\right) \rightarrow \notin (-\pi, \pi]$$

да користиме $-\frac{2\pi}{3}$

$$= 1\cdot\left(\cos\left(-\frac{2\pi}{3}\right) + i\cdot\sin\left(-\frac{2\pi}{3}\right)\right)$$

$$= -\frac{1}{2} - i\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}$$


Пример Реши $z^4 = -1$.

-1 у триг. облику? $|-1| = 1$

$$-1 = 1\cdot(-1 + 0\cdot i)$$

α? $\cos\alpha$ $\sin\alpha$

$$a = 1\cdot(\cos\pi + i\cdot\sin\pi)$$



$$z_k = \sqrt[n]{|a|}\left(\cos\frac{\alpha+2k\pi}{n} + i\cdot\sin\frac{\alpha+2k\pi}{n}\right), \quad k=0,1,2,3, \quad k=0,1,\dots,n-1$$

z_k → z_0, z_1, z_2, z_3; $|a| = 1$; $n = 4$; $\alpha = \pi$

$k=0$: $z_0 = \sqrt[4]{1}\left(\cos\frac{\pi+0\cdot\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right) =$

$= 1\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\cdot\sin\frac{\pi}{4}\right)$

$= \frac{\sqrt{2}}{2} + i\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}$

$k=1$: $z_1 = \sqrt[4]{1}\left(\cos\frac{\pi+2\pi}{4} + i\sin\frac{3\pi}{4}\right)$


$= 1\cdot\left(\cos\frac{3\pi}{4} + i\cdot\sin\frac{3\pi}{4}\right)$

$k=2$: $z_2 = \sqrt[4]{1}\left(\cos\frac{\pi+4\pi}{4} + i\cdot\sin\frac{5\pi}{4}\right)$

$= 1\left(\cos\left(-\frac{3\pi}{4}\right) + i\sin\left(-\frac{3\pi}{4}\right)\right)$

$k=3$: $z_3 = \sqrt[4]{1}\left(\cos\frac{\pi+6\pi}{4} + i\cdot\sin\frac{7\pi}{4}\right)$

$= 1\left(\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right)$



ЗАКЉУЧАК: Једначина $z^n = a$ у скупу $\mathbb{C}$ ... n-решења ... правилног n-тоугла који лежи на кружници

ПОЛИНОМИ

ДЕФ: ... x је фја $P_n(x): \mathbb{C} \to \mathbb{C}$:

$$P_n(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0,$$

где су $a_i \in \mathbb{C}$, $a_n \neq 0$, $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$.

a_i – коефицијенти полинома
a_n – водећи члан
a_0 – слободан члан
n – ред (степен) полинома

пример:
$P_0(x) = 5$
$P_1(x) = 2x+1$ $\quad Q_1(x) = 100x$
$P_2(x) = x^2 + 6$
$\vdots$
$P_6(x) = i \cdot x^6 + 5 \cdot x^5 + 4$

ДЕФ: Два полинома су једнака ... одговарајући коеф. једнаки

пример: $x^3 + 5x^2 - x \equiv ax^3 + bx^2 + cx + d$

уз x^3: $1 = a$
x^2: $5 = b$
x: $-1 = c$
x^0: $0 = d$

ДЕФ: ... и ако је $P(x) = Q(x)$ за $\forall x \in \mathbb{C}$

$$P(x) \equiv Q(x)$$
$$P_n(x) \equiv Q_n(x) \dots$$

ДЕФ: КОРЕН (НУЛА) полинома $P_n(x)$ је $x_0 \in \mathbb{C}$ такав да важи $P_n(x_0) = 0$

↓

Корен полинома = решење једн по x

$P(x) = x^2$ $\quad Q(x) = x+2$

$P(2) = 4$ $\quad Q(2) = 4$

$P(10) = 100$ $\quad Q(10) = 12$

Која је нула (корен)? $Q(x) = 0$?

$x+2 = 0, \quad x = -2$

$Q(-2) = 0$

ДЕЉЕЊЕ ПОЛИНОМА:

$P_n(x) : Q_m(x) = P_{n-m}(x)$

$(x^7 - x^6 + 2x^4 - 3x) : (x^3+1) = x^4 - x^3 + x + 1$

$-x^7 \pm x^4$

$-x^6 + x^4 - 3x$

$\mp x^6 \mp x^3$

$x^4 + x^3 - 3x$

$-x^4 \pm x$

$x^3 - 4x$

$-x^3 \pm 1$

$-4x - 1$ ← R_k, $k < m$

Хоћемо да је $\leq$ степен

Остатак

$$P_n(x) = Q_m(x) \cdot P_{n-m}(x) + R_k(x), \quad k < m$$

Ако је $R_k(x) \equiv 0 \Rightarrow P_n(x)$ дељив полином $Q_m(x)$

ДЕЛИЛАЦ, ФАКТОР, ..

ТЕОРЕМА ОСНОВНИ СТАВ АЛГЕБРЕ

Сваки п. $n \geq 1$ са коеф. из поља $\mathbb{C}$ има бар једну нулу у пољу комп. бројева.

БЕЗУОВА ТЕОРЕМА:

Остатак који се добија при дељ. пол. $P(x)$ са $x-a$ једнак је $P(a)$.

доказ: $P(x) = (x-a)\cdot S(x) + R_0^{\nearrow}(x)$ мора да буде 0, јер претп. да је степен мањи од

$$P(x) = (x-a)\cdot S(x) + r$$

↓ важи за свако x, па важи и за $x=a$

$$P(a) = \underbrace{(a-a)}_{=0}\cdot S(a) + r$$

$P(a) = r$, а што је и требало доказати.

пример $P_3(x) = x^3+x^2+x+1$, $Q_m(x) = x-1$. Колики је остатак при дељењу $P_3(x)$ са $Q_m(x)$?

можемо чешће..

$$(x^3+x^2+x+1) : (x-1) = \ldots$$

а можемо да искористимо Безуов.

Шта је a из Безуовог става? 1

$\Rightarrow$ остатак је $P(a) = P(1) = 1^3+1^2+1+1 = 4$

ПОСЛЕДИЦА: $P(a)=0 \iff x-a \mid P(x)$

доказ: $\boxed{\Rightarrow:}$ Нека важи $P(a)=0$.

$P(x) = (x-a)\cdot S(x) + r$

искористимо $x=a$: $P(a) = (a-a)\,S(a) + r$

$0 = r$

$P(x) = (x-a)\cdot S(x) \Rightarrow x-a \mid P(x)$

$\Leftarrow$: Нека важи $x-a \mid P(x)$.

$P(x) = (x-a)\cdot S(x)$

ова важи за $\forall x$, па и за $x=a$

$P(a) = (a-a)\cdot S(a) = 0$

РАСТАВАЊЕ ПОЛИНОМА НА ЧИНИОЦЕ (ФАКТОРЕ):

$P_2(x) = x^2 - x - 6$

За $x=3$ важи $x^2 - x - 6 = 0$

$3^2 - 3 - 6 = 0$ ✓

$\Rightarrow x-3 \mid P_2(x)$ → Нашли смо 1 чинилац!

$(x^2 - x - 6) : (x-3) = x+2$

$\pm x^2 \mp 3x$

$2x - 6$

→ Нашли смо други чинилац!

$P_2(x) = x^2 - x - 6 = (x-3)(x+2)$

факторисали смо полином

У општем случају:

x_1 корен од $P_n(x) \Rightarrow x - x_1 \mid P_n(x) \Rightarrow P_n(x) = (x-x_1) \cdot P_{n-1}(x)$

x_2 корен од $P_{n-1}(x) \Rightarrow x - x_2 \mid P_{n-1}(x) \Rightarrow P_n(x) = (x-x_1)(x-x_2) \cdot P_{n-2}(x)$

x_3 корен од $P_{n-2}(x) \Rightarrow \dots$

Сторишмо индукцијом док не дођемо до:

$$P_n(x) = (x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)\cdots(x-x_n)\cdot a_n$$

Неки x_i могу бити једнаки!

Пример x^2+2x+1

-1 је корен $\Rightarrow x-(-1) \mid x^2+2x+1$

$x^2+2x+1 = (x+1)\cdot P_1(x)$

$(x^2+2x+1) : (x+1) = x+1$

$\underline{x^2 \pm x}$

$x+1$

$\Rightarrow x^2+2x+1 = (x+1)(x+1) = (x+1)^2$

-1 је нула реда 2.