
Условна вероватноћа (наставак)

16.11.2026.

Models based on conditional probabilities

- Event A: Airplane is flying above
  Event B: Something registers on radar screen



$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A) = 0.05 \cdot 0.99 = 0.0495$$

$$P(B) =$$

$$P(A \mid B) =$$

одавде


$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$$

$$\Rightarrow P(AB) = P(A) \cdot P(B|A)$$

A = "авион је на небу"

B = "радар је нешто регистровао"


	A	A^c
B^c	AB^c	A^cB^c
B	AB 0.0495	A^cB




$P(AB)$ ← годишња киша која нас тера до искоја AB

$P(B) = ?$ B је киша

$B = AB \cup A^cB$





Имају два дисјунктна догађаја

а3) $P(AB \cup A^cB) = P(AB) + P(A^cB)$

$= 0.0495 + 0.095 = 0,1445$

$P(A^c \cap B) = 0.95 \cdot 0.10 = 0.095$

$P(A|B) = ?$


$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0.0495}{0.1445} = 0.34$$

ОСЕТЛИВОСТ = "болестан препознаје као болесног"

СПЕЦИФИЧНОСТ = "здрав тест правилно препознаје као болесног"

Multiplication rule

$$P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B \mid A) \cdot P(C \mid A \cap B)$$




$P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B|A) \cdot P(C|A \cap B)$

$= P(A \cap B) \cdot P(C|A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A) \cdot P(C|A \cap B)$

ФОРМУЛА ТОТАЛНЕ ВЕРОВАТНОЋЕ

Total probability theorem

- Divide and conquer
- Partition of sample space into A_1, A_2, A_3
- Have $\mathbf{P}(B \mid A_i)$, for every i



- One way of computing $\mathbf{P}(B)$:


$$\begin{aligned}\mathbf{P}(B) = \quad & \mathbf{P}(A_1)\mathbf{P}(B \mid A_1) \\ + \ & \mathbf{P}(A_2)\mathbf{P}(B \mid A_2) \\ + \ & \mathbf{P}(A_3)\mathbf{P}(B \mid A_3)\end{aligned}$$

A_1 = "авион је на небу"

A_2 = "још птица је на небу"

A_3 = "нема ничега на небу"

Исцртајте:



А сада

$$P(B) = P(A_1B) + P(A_2B) + P(A_3B)$$
$$= P(A_1)\cdot P(B|A_1) + P(A_2)\cdot P(B|A_2) + P(A_3)\cdot P(B|A_3)$$


↑ Ово називамо вер. (↓ Може се проширити до произвољног n.)

A_i ← ХИПОТЕЗЕ

↑ Разлажу простор исхода E на подскупове $A_1, A_2, \ldots$ тако да:

- су међусобно дисјунктни
- њихова унија чини цео $= E$

пример: Имамо 3 исте кутије



Која је вероватноћа да смо изабрали плаву кутију?

P = " изабрали смо плаву"


$p(P) =$

$p(P|A) = \frac{1}{2}$ $p(P|B) = \frac{3}{4}$ $p(P|C) = \frac{1}{5}$

Хипотезе су кутије (A, B, C)

$p(A) = \frac{1}{3}$ $p(B) = \frac{1}{3}$ $p(C) = \frac{1}{3}$

↑ вер. да смо одабрали кутију A



$p(P) = P(AP) + P(BP) + P(CP)$

$= P(A) \cdot p(P|A) + P(B) \cdot p(P|B) + p(C) \cdot p(P|C)$

$= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{5} = \dots$

БАЈЕСОВО ПРАВИЛО

A = " човек је на плажи" ← ХИПОТЕЗА

$p(A) = 0.05$ АПРИОРИ вероватноћа

тј. вероватноћа догађаја пре извођења експеримента

$p(A|B) = 0.34$ АПОСТЕРИОРИ вероватноћа

тј. вер. човек одабрани експеримента

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A)\cdot P(B|A)}{P(B)}$$

Бајесова ф-ла даје везу између две условне вероватноће

$$P(A|B) = \frac{P(A)\cdot P(B|A)}{P(B)}$$


НЕЗАВИСНОСТ

Пример 3 узастопна бацања правилног новчића

$P(G) = p$, $P(P) = 1-p$

Models based on conditional probabilities

- 3 tosses of a biased coin:
  $P(H) = p$, $P(T) = 1-p$



→ Ако догађаји се подудре НЕЗАВИСНОСТ

"прва је друга глава"

$P(THT) = (1-p)\cdot p(1-p)$

Како одређујемо p за ових догађаја

P ОД Р

Вероватноћа комплементарног догађаја?

$P(1 \text{ head}) = p(HTT) + p(THT) + p(TTH) =$
$p(1-p)(1-p) + (1-p)\cdot p(1-p) + (1-p)(1-p)\cdot p = 3p(1-p)^2$

$P(\text{first toss is H} \mid 1 \text{ head}) =$

HTT "1 head"

Интуитивно јасно: у оба 3 догађаја, тачна „одговара" само 1 (једна), а укупно су једнаковероватни

$\Rightarrow p = \frac{1}{3}$

$$\frac{P(HTT \cap \text{"1 head"})}{P(\text{"1 head"})} = \frac{P(\{\text{"HTT"}\} \cap \{\text{"HTT"}, \text{"THT"}, \text{"TTH"}\})}{3p(1-p)^2} =$$

$$= \frac{P(\text{"HTT"})}{3p(1-p)^2} = \frac{p(1-p)(1-p)}{3p(1-p)^2} = \frac{1}{3}$$

ДЕФ: Два догађаја су НЕЗАВИСНА ако

$$P(B|A) = P(B).$$


(важи)

користимо се $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A)$

$$\Rightarrow P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

↙ доказ је ово узети за деф. јер не мора $P(A) \neq 0$

→ симетрична деф. важи и $P(A|B) = P(A)$



Да ли су ова догађаја независна?

Да?

Не мешати независност и сагласност!!!


Интуитивно:

Ако се реализовао A сигурно само да се B није реализовао! $\Rightarrow$ ЗАВИСНИ СУ!

$P(A) \neq 0, \; P(B) \neq 0 \Rightarrow P(A) \cdot P(B) \neq 0$

$AB = \emptyset \Rightarrow P(AB) = 0$

} по фи дакле зависни ↓ $P(A) \cdot P(B) \neq P(AB)$



Ако је пресек непразан, не можем одмах знаити да ли су независни!

Него мора да се провери једнаквост

$$P(A)\cdot P(B) \overset{?}{=} P(A\cap B)$$

The king's sibling

- The king comes from a family of two children. What is the probability that his sibling is female?

$E = \{$"бб", "бс", "сб", "сс"$\}$




Условни модел B (имамо чињеницу да постоји син)

У овом случају исходи је могуће да имамо девојку

$$p = \frac{P(бс)+P(сб)}{P(B)} \quad \frac{2\cdot\frac{1}{4}}{3\cdot\frac{1}{4}} = \frac{2}{3}$$

ИЗРАЧУНАВАЊЕ

пример Одредити број подскупова скупа $\{1,2,..,n\}$



пример А колико има двочланих подскупова?

БИНОМНИ КОЕФИЦИЈЕНТ

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}, \quad 0! = 1$$

$$\binom{5}{2} = \frac{5!}{2!\,3!} = \frac{5\cdot 4\cdot 3\cdot 2\cdot 1}{2!\,3\cdot 2\cdot 1}$$

$$\binom{10}{3} = \frac{10\cdot 9\cdot 8}{3!}$$

Број k-точланих подскупова скупа од n елемената

Колико има двочланих подскупова скупа од 5 елемената

пример
$$\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k} = 2^n$$

пример ВЕРОВАТНОЋЕ СА БИНОМН. КОЕФ

n независних догађаја исход, $p(G) = p$

$$p(GPPGGG) = p(G)\,p(P)\,p(P)\,p(G)\,p(G)\,p(G) = p(1-p)(1-p)\,p\,p\,p$$
$$= p^4\cdot(1-p)^2$$

$$p(\text{секвенце}) = p^{\#\text{глава у секвенци}}\cdot(1-p)^{\#\text{писама у секвенци}}$$

$$p(k \text{ глава}) = p^k(1-p)^{n-k}\cdot(\text{број секвенци које имају } k \text{ глава})$$

Колико их је?

Колико секвенци са k-тим главама постоји?



На колико начина можемо изабрати k позиција за G

$$\Rightarrow \binom{n}{k}$$

$$\rightarrow P(k \text{ глава}) = \binom{n}{k} \cdot p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \ldots, n$$


пример Шта је било

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = 1$$

пример Бацамо новчић 10 пута. $P(G) = p$

Нека је B = " 3 од 10 бацања су G ".

Пи. да се B догодило. Колика је (условна) вероватноћа да је у прва два бацања добијена глава.



A = " у прва два бацања глава је G "

- Ако посматрамо цело E НЕМАЈУ све секвенце једнаку вероватноћу.

- Али ако посматрамо само B у њему су све секв. једнаковероватноће и износе

$\Rightarrow p(\text{било које секвенце у } B) = p^3(1-p)^7$

- А колико има различитих секвенци у B? $\binom{10}{3}$

- $p(A|B) = ?$ Од свих догађаја у B, колико њих чине 2 главе?

$$\frac{p(A \cap B)}{p(B)} = \frac{|A \cap B| \cdot p^3(1-p)^7}{\binom{10}{3} \cdot p^3(1-p)^7}$$

← кардиналност (=број ел. скупа)

Због вероватноће нас интересује да укључимо у рачун кр које се скратиле

$$= \frac{|A \cap B|}{|B|} = \frac{8}{\binom{10}{3}} = (*)$$

нам само број ових елемената скупа

колико их има?

колико има повољних секвенци, делимо са колико има УКУПНО секвенци

GG ---------- ↑↑ прве 2 главе фиксиране

преостали 8 места

⇒ имамо укупно 8 различитих секвенци

$$(*) = \frac{8}{\frac{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 8}{3 \cdot 2}} = \frac{8}{120} = \frac{1}{15}$$

Пример Шпил од 52 карте се дели четворици играча. Наћи p да сваки од играча добије кеца.