
# ЈЕДНАЧИНЕ РАВНИ




$\vec{n}_\alpha$ - вектор нормале на раван $\alpha$

$\vec{n}_\alpha(A,B,C)$

$M_0$ тачка која припада равни

$M_0(x_0,y_0,z_0)$

Ово је дато (познато)

Како са ова 2 податка описати све тачке из равни $\alpha$?

За било коју тачку $M(x,y,z)\in\alpha$ важиће $\vec{M_0M} \perp \vec{n}_\alpha$

$\vec{n}_\alpha \perp \vec{M_0M} \Rightarrow \vec{n}_\alpha \cdot \vec{M_0M} = 0$

$M_0(x_0,y_0,z_0)$ => да и $\vec{r}_0$ има исте коорд. $\vec{r}_0(x_0,y_0,z_0)$

$M(x,y,z)$ => $\vec{r}(x,y,z)$

$\vec{r}_0 + \vec{M_0M} = \vec{r} \Rightarrow \vec{M_0M} = \vec{r} - \vec{r}_0$

$\vec{n}_\alpha \cdot (\vec{r} - \vec{r}_0) = 0$

$\vec{n}_\alpha \cdot \vec{r} - \vec{n}_\alpha \cdot \vec{r}_0 = 0$

овде је све познато $-(A,B,C)\cdot(x_0,y_0,z_0)$

$= D$ (неки број)

$$\vec{n}_\alpha \cdot \vec{r} + D = 0$$

**ОПШТА ВЕКТОРСКА Ј-НА РАВНИ**

---

Једначина која се чешће примењује у задацима је „општа":

$\overrightarrow{M_0M}$ ?

$M_0(x_0,y_0,z_0)$ $M(x,y,z)$

$\overrightarrow{M_0M}\,(x-x_0,\ y-y_0,\ z-z_0)$

$\vec{n}\cdot\overrightarrow{M_0M}=0$

$(A,B,C)\cdot(x-x_0,\ y-y_0,\ z-z_0)=0$

$A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$


$Ax-Ax_0+By-By_0+Cz-Cz_0=0$

$\vec{n}\,(A,B,C)$, $M_0(x_0,y_0,z_0)$ — ова е составено од точките

$Ax+By+Cz\ \underbrace{-Ax_0-By_0-Cz_0}_{\text{пар. } D}=0$


$Ax+By+Cz+D=0$

**ОПШТА ЈНА РАВНИ**




$\vec{a}\,(4-1,\ 5-2,\ 7-3)$

$\vec{a}\,(3,\ 3,\ 4)$




**Пример** $\vec{n}^{\,(A\ B\ C)}(1,2,3)$ е вектор нормале, а точка $M(5,6,8)$ припаѓа на $\alpha$. Најди општа јна рамнина.

Можеме да напишеме директно од

$A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$

$\vec{n}(1,2,3)$ $M(5,6,8)$

$A\ B\ C$ $x_0,y_0,z_0$

$1(x-5)+2(y-6)+3(z-8)=0$

$x-5+2y-12+3z-24=0$, $\quad +(-41)$

$x+2y+3z-41=0$

$Ax+By+Cz+D=0$ ← Какав је пролаз ове равни у коорд. систему?

↓

Ако су $A,B,C,D \neq 0$

$Ax+By+Cz=-D \quad /:(-D)$

$\frac{Ax}{-D}+\frac{By}{-D}+\frac{Cz}{-D}=1$


$$\frac{x}{\frac{-D}{A}}+\frac{y}{\frac{-D}{B}}+\frac{z}{\frac{-D}{C}}=1$$

СЕГМЕНТНИ ОБЛИК ЈНЕ РАВНИ

$\alpha: \quad \frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1$

↓ ↓ ↓

сегменте (одсечке) на координатним осама





$x+2y+3z-41=0$

$x+2y+3z=41 \quad /:41$

$\frac{x}{41}+\frac{y}{\frac{41}{2}}+\frac{z}{\frac{41}{3}}=1$

# Како се одредува рамнина низ 3 точки?

$M_1(x_1, y_1, z_1)$, $M_2(x_2, y_2, z_2)$, $M_3(x_3, y_3, z_3) \in \alpha$




Нар овако:

За секоја точка M од α да важи дека се вектори $\overrightarrow{M_1M_2}$, $\overrightarrow{M_1M_3}$, $\overrightarrow{M_1M}$ компланарни.

$$\Rightarrow [\overrightarrow{M_1M_2}, \overrightarrow{M_1M_3}, \overrightarrow{M_1M}] = 0$$

$\overrightarrow{M_1M_2} = (x_2-x_1, y_2-y_1, z_2-z_1)$

$\overrightarrow{M_1M_3} = (x_3-x_1, y_3-y_1, z_3-z_1)$

$\overrightarrow{M_1M} = (x-x_1, y-y_1, z-z_1)$

$$\begin{vmatrix} x_2-x_1 & y_2-y_1 & z_2-z_1 \\ x_3-x_1 & y_3-y_1 & z_3-z_1 \\ x-x_1 & y-y_1 & z-z_1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix} = [\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}]$$

Или преку вектора нормала и точка која припаѓа рамнината.

Точка? Било која, нпр. $M_1$

Вектор нормала? Нпр. векторски производ било кои два вектора, нпр $\vec{n_2} = \overrightarrow{M_1M_2} \times \overrightarrow{M_1M_3}$


# МЕЂУСОБНИ ОДНОС ДВЕ РАВНИ

$\alpha_1$: $A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$ $\quad \vec{n}_{\alpha_1} = (A_1, B_1, C_1)$

$\alpha_2$: $A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$ $\quad \vec{n}_{\alpha_2} = (A_2, B_2, C_2)$

## 1. Пресек је ПРАВА.

Ако се $\alpha_1$ и $\alpha_2$ секу, онлен има $\infty$ много решења која представљају тачке једне праве.




Под којим углом се секу? Угао између равни је угао између њихових нормала.

$$\cos\sphericalangle(\vec{n}_{\alpha_1}, \vec{n}_{\alpha_2}) = \frac{\vec{n}_{\alpha_1} \cdot \vec{n}_{\alpha_2}}{|\vec{n}_{\alpha_1}| \cdot |\vec{n}_{\alpha_2}|}$$

Ако важи $\vec{n}_{\alpha_1} \perp \vec{n}_{\alpha_2}$ онда су равни ПОРЛАЊЕ

$$\alpha_1 \perp \alpha_2 \iff \vec{n}_{\alpha_1} \perp \vec{n}_{\alpha_2} \iff \vec{n}_{\alpha_1} \cdot \vec{n}_{\alpha_2} = 0$$

$$A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0$$

## 2. Две равни се ПОКЛАПАЈУ.


Паралелне равни немају $\infty$ много заједничких пресека, али ако

да су им вектори нормала колинеарни!

$\alpha_1 = \alpha_2 \iff \vec{n}_{\alpha_1}$ и $\vec{n}_{\alpha_2}$ колинеарни и $D_1 = D_2$

3. Две равни су ПАРАЛЕЛНЕ

Тачке равни немају тачке пресека (нп. систем нема решења).




$\alpha_1 \parallel \alpha_2 \iff \vec{n}_{\alpha_1}$ и $\vec{n}_{\alpha_2}$ колинеарни и $D_1 \neq D_2$

$\vec{n}_{\alpha_1} = k \cdot \vec{n}_{\alpha_2}$


$(A_1, B_1, C_1) = k \cdot (A_2, B_2, C_2)$

$A_1 = k \cdot A_2$
$B_1 = k \cdot B_2$
$C_1 = k \cdot C_2$

$(k =) \quad \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$

# ЈЕДНАЧИНЕ ПРАВЕ

$M_0(x_0, y_0, z_0)$
$\vec{p}(l, m, n)$
} Права једнозначно одређена тачком кроз коју пролази и вектором правца $\vec{p}$




За дато $M \in p$ тада за свако $\vec{p}$ и $\vec{M_0M}$ колинеарни

$\vec{p} \times \vec{M_0M} = \vec{0}$

$\vec{r_0} + \vec{M_0M} = \vec{r} \Rightarrow \vec{M_0M} = \vec{r} - \vec{r_0}$

$\vec{p} \times (\vec{r} - \vec{r_0}) = 0$

$\vec{p} \times \vec{r} - \vec{p} \times \vec{r_0} = 0$

$\vec{p} \times \vec{r} = \underbrace{\vec{p} \times \vec{r_0}}_{\text{ово је дато} = \vec{q}}$

$$\boxed{\vec{p} \times \vec{r} = \vec{q}}$$

ЈЕДНАЧИНА ПРАВЕ У ВЕКТОРСКОМ ОБЛИКУ

$\vec{r} = \vec{r_0} + \vec{M_0M}$, $\vec{M_0M}$ колинеарно са $\vec{p}$

$\vec{M_0M} = t \cdot \vec{p}$

$\vec{r} = \vec{r_0} + t \cdot \vec{p}$

$(x, y, z) = (x_0, y_0, z_0) + t \cdot (l, m, n)$

$$\boxed{\begin{aligned} x &= x_0 + t \cdot l \\ y &= y_0 + t \cdot m \\ z &= z_0 + t \cdot n \\ t &\in \mathbb{R} \end{aligned}}$$

ПАРАМЕТАРСКА ЈЕДНАЧИНА ПРАВЕ

пример: $x = 1 + t$, $y = 2 - t$, $z = 3 + 2t$

мењањем $t$ добијамо остале тачке са ове праве

једна тачка са праве $(1, 2, 3)$

нпр. $t = 1$: $x = 1 + 1 = 2$, $y = 2 - 1 = 1$, $z = 3 + 2 = 5$ $(2, 1, 5)$

$t = 2$: $x = 1 + 2 = 3$, $y = 2 - 2 = 0$, $z = 3 + 4 = 7$ $(3, 0, 7)$

А како очитавамо вектор правца?

$x = 1 + t$
$y = 2 - t$
$z = 3 + 2t$

$X = X_0 + t \cdot l$
$y = y_0 + t \cdot m$
$z = z_0 + t \cdot n$
$t \in \mathbb{R}$

— вектор правца

једна тачка са праве

$\vec{p} = (1, -1, 2)$

Пример. Дата је тачка $T(5,7,9)$ и вектор правца $\vec{p}(2,3,5)$. Како изгледа једн. праве?

$x = 5 + 2t$
$y = 7 + 3t$
$z = 9 + 5t$

Ако све изразимо преко $t$?

$X = X_0 + t \cdot l \longrightarrow t = \frac{x - x_0}{l}$


$y = y_0 + t \cdot m \longrightarrow t = \frac{y - y_0}{m}$

$z = z_0 + t \cdot n \longrightarrow t = \frac{z - z_0}{n}$

$$t = \boxed{\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n}}$$

КАНОНСКИ ОБЛИК ЈЕДН. ПРАВЕ

Како се одређује једна права као пресек две равни?




$$p: \begin{cases} A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0 \\ A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0 \end{cases}$$

$\vec{n_{\alpha_1}} \perp p \quad \vec{n_{\alpha_2}} \perp p$

$\Rightarrow \vec{n_{\alpha_1}} \times \vec{n_{\alpha_2}}$ даје вектор који је нормалан на обе и може бити вектор правца $\vec{p} = \vec{n_{\alpha_1}} \times \vec{n_{\alpha_2}}$ (дужине $l, m, n$)

– А како формулисати неку тачку са праве?

Нпр фиксирамо једну променљиву ($x=0$)

$$\begin{cases} A_1\cancel{x}^{0}+B_1y+C_1z+D_1=0 \\ A_2\cancel{x}_{0}+B_2y+C_2z+D_2=0 \end{cases}$$


остаје систем са 2 једначине и две непознате...

# ОДНОС ДВЕ ПРАВЕ

$p_1: \frac{x-x_1}{l_1} = \frac{y-y_1}{m_1} = \frac{z-z_1}{n_1} \Rightarrow \vec{p_1}(l_1, m_1, n_1), M_1(x_1, y_1, z_1)$

$p_2: \frac{x-x_2}{l_2} = \frac{y-y_2}{m_2} = \frac{z-z_2}{n_2} \Rightarrow \vec{p_2}(l_2, m_2, n_2), M_2(x_2, y_2, z_2)$

## 1. Праве су ПАРАЛЕЛНЕ




$p_1 \parallel p_2 \Leftrightarrow$

(1) $[\vec{p_1}, \vec{p_2}, \vec{M_1M_2}]=0$ и $\vec{p_1}$ и $\vec{p_2}$ колинеарни


$\vec{p_1} = k \cdot \vec{p_2}$

$(l_1, m_1, n_1) = k \cdot (l_2, m_2, n_2)$

$$(k=) = \frac{l_1}{l_2} = \frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2} \quad (2)$$

**напомена:** Уколико немају заједн. тачке онда су паралелне, у супротном се мимоилазе.


2. Праве се СЕКУ




Сва 3 вектора праваца су у истој равни, нпр. $\vec{p_1}$, $\vec{p_2}$, $\vec{M_1M_2}$ комплан парни

$$[\vec{M_1M_2}, \vec{p_1}, \vec{p_2}] = \begin{vmatrix} x_2-x_1 & y_2-y_1 & z_2-z_1 \\ l_1 & m_1 & n_1 \\ l_2 & m_2 & n_2 \end{vmatrix} = 0$$


али не секу се дуж




због чега

$$(l_1, m_1, n_1) \neq k \cdot (l_2, m_2, n_2)$$

3. Праве су МИМОИЛАЗНЕ.




Не секу се дуж у истој равни!

због чега

$$[\vec{M_1M_2}, \vec{p_1}, \vec{p_2}] \neq 0$$